

CampVac SG 9R

Vacuna viva liofilizada contra infecciones por *Salmonella gallinarum*.

Suspensión inyectable

COMPOSICION:

Cada 1ml de producto liofilizado contiene:

Salmonella gallinarum – 9 R título mín 2,0 x10⁷ UFC
Excipientes estabilizantes c.s.p. 1 dosis

Diluyente: Solución buffer estéril.

PROPIEDADES:

La tifoidea aviar genera preocupación en aves en crecimiento y adultas, por la alta mortalidad en granja.

La transmisión vertical de esta enfermedad complica su control: las gallinas se convierten en portadoras infectadas de forma subclínica y transmiten la infección a sus embriones, en el huevo.

La tifoidea aviar es producida por *Salmonella enterica*, subespecie enterica, serovar *Gallinarum*, biovar *Gallinarum* (*Salmonella gallinarum*), un bacilo Gram negativo de la familia Enterobacteriaceae (serogrupo D).

CampVac SG 9R; es una vacuna viva contra *Salmonella gallinarum*, el patógeno responsable por causar la tifoidea aviar, enfermedad reconocida por causar pérdidas económicas devastadoras para la industria avícola. La cepa de la vacuna es segura, estable genéticamente y eficaz.

INDICACIONES:

Para prevención de la tifoidea aviar causada por *Salmonella gallinarum*.

DOSIS:

0,2 ml por ave.

Primo vacunación entre 5 a 6 semanas

Segunda dosis entre 12 a 15 semanas

Vía de administración y forma de aplicación

Se administra por vía inyectable u oral, al menos una de las aplicaciones debe ser inyectable (oral/inyectable o inyectable/ inyectable o inyectable/oral).

PREPARACIÓN DE LA VACUNA

Rehidratar la pastilla de vacuna liofilizada en diluyente propio.

Con una jeringa y aguja estéril, tomar el volumen suficiente del diluyente e inyecte en el frasco que contiene la vacuna. Homogenice el frasco con movimientos suaves, tome todo el contenido y transfiera al frasco de diluyente.

Vuelva esa solución vacuna nuevamente al frasco de la vacuna para remover cualquier residuo, hasta homogeneizar la solución.

Dilución: 1000 dosis 200ml de diluyente
Dilución: 2000 dosis 400ml de diluyente

PRECAUCIONES:

- Usar material estéril para su administración y aplicar estrictas medidas de asepsia. Usar bajo supervisión del Médico Veterinario. Una vez abierto el frasco utilizar todo el contenido, de lo contrario desechar.
- No administrar en animales enfermos, estresados o parasitados.
- Vacunar solamente animales sanos.
- No utilice antibióticos u otros medicamentos de acción sistémica en el periodo comprendido entre 7 días antes y 14 días después de la vacunación.
- El establecimiento de la inmunidad se completará en 3 semanas post vacunación y podrá variar de ave a ave.
- Conservar entre 2 – 8°C. No congelar ni exponer a la luz directa del sol.
- Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PERIODO DE RETIRO:

- No tiene

PRESENTACION:

Frasco x 1000 dosis

Frasco x 2000 dosis

REGISTRO SANITARIO: RIP – BIO – 39

ELABORADO POR: BioCamp Laboratorios Ltda.

DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA. LTDA.