

RILEXINE 500 N[®]

Suspensión intramamaria para la prevención de mastitis en el período seco.

Tópica

COMPOSICION:

Cada jeringa contiene:

Cefalexina (Benzatínica)	250 mg
Neomicina (Sulfato)	250 mg
Excipiente de larga acción c.b.p.	10 ml

PROPIEDADES:

Es una suspensión antibiótica intramamaria a base de cefalexina benzatínica y neomicina (sulfato), asociación de amplio espectro, con efecto bactericida y que actúa por inhibición de la síntesis proteica y de la pared celular bacteriana.

La cefalexina es un antibiótico que tiene un alto poder de difusión en la glándula mamaria.

La cefalexina tiene alta liposolubilidad y baja unión a proteínas, esto facilita su difusión hasta el sitio blanco de la infección.

La neomicina, es un antibiótico “Tiempo Dependiente”, con un periodo residual amplio, lo que permite prolongar el tiempo de permanencia en la ubre y potencializar el efecto de la cefalexina.

La cefalexina es un antibiótico que actúa específicamente contra bacterias Gram positivas, lo que previene el desarrollo de infecciones causadas por estreptococos y estafilococos causantes de mastitis contagiosa.

La neomicina es un antibiótico específico contra bacterias Gram negativas, lo que previene el desarrollo de enterobacterias y algunos estreptococos causantes de mastitis ambiental.

Tiene un excipiente especial que le provee de una lenta liberación y le da un efecto prolongado. Esto evita la presentación de nuevos casos de mastitis durante el periodo seco y al parto.

Tiene un aplicador especial con el sistema esteriflex que permite elegir entre cánula larga y cánula corta para una aplicación más segura.

INDICACIONES:

Para la prevención de la mastitis (contagiosas o ambientales) durante el periodo seco.

DOSIS:

Administrar el contenido de una jeringa por cada cuarto al final del último ordeño del periodo de lactación.



RECOMENDACIONES:

- Aplicar el producto únicamente en la punta del pezón, usando la cánula corta.
- Antes de aplicar el producto se recomienda desinfectar la punta del pezón con una toalla antiséptica.
- Para lograr una mejor difusión del medicamento, aplique un ligero masaje sobre la glándula mamaria.

PRECAUCIONES:

- No aplicar a vacas en periodo de lactación ni a vacas con cuartos enfermos.
- Consérvese en lugar fresco y seco protegido directa del sol.

PRESENTACION:

Jeringa x 10 ml.

REGISTRO SANITARIO: 2C3 – 15144 – AGROCALIDAD

ELABORADO POR: VIRBAC
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA.