

## TS-2<sup>®</sup>

Antibiótico  
Inyectable

### COMPOSICION:

Tilosina Base	200 mg
Sulfametoxipiridacina	40 mg
Excipiente c.s.p.	1 ml

### PROPIEDADES:

TS-2 es una asociación de una sulfamida retardada, la **Sulfametoxipiridacina**, con un antibiótico de amplio espectro.

La **Tilosina**. Es activo frente: Micoplasmas: *M. gallisepticum*, *M. synoviae*.

**Gram (+):** *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium* spp., *Corynebacterium pyogenes*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*.

**Gram (-):** *Hemophilus*, *Vibrio coli*, *Pasteurella* spp., *Fusobacterium necrophorum*, *Bordetella bronchiseptica*.

### INDICACIONES:

Destinado a: Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y aves.

Bovinos, ovinos y caprinos: neumonías, enteritis infecciosa, metritis, mastitis, agalaxia, panadizo interdigital (pododermatitis necrótica), infecciones bacterianas post-cirugías e infecciones de la piel.

Porcinos: neumonía enzoótica, neumonías, rinitis atrófica, disentería vibriónica y colibacilosis.

Aves: enfermedades respiratorias crónicas (CRD), micoplasmosis y sinusitis infecciosa.

### DOSIS:

Vía: Intramuscular (I.M.)

Especie	Dosis	Frecuencia
Bovinos	0,5 – 1 ml/10 kg peso del animal	Cada 24 horas de 2-5 días
Ovinos, caprinos y porcinos	1 ml/10 kg peso del animal	Cada 24 horas de 2-5 días

Vía subcutánea (S.C.).

Especie	Dosis	Frecuencia
Aves	0,13 ml / Kg de peso del animal por día.	Durante 3 días.

**PRECAUCIONES:**

- No administrar junto a penicilinas o eritromicina.
- No administrar más de 25 ml en el punto de inoculación.
- En aves, se recomienda la administración subcutánea, ya que la administración intramuscular podría producir necrosis local en el punto de inyección.
- La administración de grandes dosis puede originar procesos gástricos. Se recomienda no superar 5 veces la dosis terapéutica.
- Los tratamientos prolongados pueden ocasionar reblandecimiento de las heces.

**TIEMPO DE RETIRO:**

Carne: 15 días.

Leche: 4 días.

No administrar a aves ponedoras cuyos huevos se destinen al consumo humano.

**PRESENTACION:**

Envase x 100 ml

**REGISTRO SANITARIO:** 2C1 – 3558 – AGROCALIDAD

**ELABORADO POR:** LABORATORIOS MAYMO S.A.

**DISTRIBUIDO POR:** IMVAB CIA.LTDA.